

CERVICITE: (ENDO)CERVICITE MUCOPURULENTE

• Aspects cliniques et commentaires

- Pathologie.
 - Exsudat purulent ou mucopurulent visible dans le canal endocervical ou sur un frottis endocervical.
 - Saignements continus, facilement induits par le passage doux d'un coton-tige par le col de l'utérus.
 - Souvent asymptomatique, certains patients se plaignent de pertes vaginales anormales ou de saignements en dehors des menstruations.
- Azithromycine ne peut jamais être utilisé en monothérapie dans cette indication. Une dose unique de 1 g po suffit pour éradiquer *Chlamydia trachomatis*, mais pas pour l'éradication de *Neisseria gonorrhoeae*. En conséquence, IUSTI recommande d'administrer une dose unique de 2 g po.
- Ceftriaxone: dans cette indication remboursée en ambulatoire par l'INAMI.

• Pathogènes impliqués

- *Neisseria gonorrhoeae*.
- *Chlamydia trachomatis*.
- *Mycoplasma genitalium*.
- *Trichomonas vaginalis*.
- *Herpes simplex virus*.

Souvent il est impossible d'identifier un pathogène.

• Traitement anti-infectieux empirique

- Dans la plupart des cas, aucun traitement empirique (seulement traitement documenté). En attente des résultats des examens microbiologiques, un traitement anti-infectieux peut éventuellement être initié si assez de preuves convaincantes de certaines infections (infection chez le partenaire, présence de coques à Gram-négatif dans les sécrétions, ...).
- Il peut être raisonnable de traiter en empirique les patients qui probablement ne se présenteront pas pour un suivi correct (régimes couvrant *Neisseria gonorrhoeae* + *Chlamydia trachomatis*).
 - Régimes.
 - Premier choix: ceftriaxone + azithromycine.
 - Alternative: spectinomycine + doxycycline.
 - Posologies standard.
 - Azithromycine: dose unique de 2 g po.
 - Ceftriaxone: dose unique de 500 mg iv ou im.
 - Doxycycline: 200 mg po q24h ou 100 mg po q12h.
 - Spectinomycine: dose unique de 2 g im.
 - Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté).
 - Azithromycine, ceftriaxone, spectinomycine: dose unique.
 - Doxycycline: 7 jours.