

EHRlichIOSE: INFECTION A *EHRlichIA EWINGII*

• Aspects cliniques et commentaires

- Zoonose.
 - Réservoir: cerfs, chiens,.... (*Ehrlichia chaffeensis*, *Ehrlichia ewingii*, ...).
 - Transmission: tiques (*Amblyomma americanum*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes* spp., ...).
- Dans le passé *Ehrlichia ewingii* était un pathogène du chien, ces dernières années des infections humaines (surtout chez des patients immunodéprimés) ont été rapportées.
- Réactions sérologiques croisées entre *Ehrlichia ewingii* et *Ehrlichia chaffeensis*, diagnostic nécessite PCR spécifique.
- Similaire à l'éhrlichiose humaine monocyttaire, mais moins grave.
- Centre national de référence belge: Hôpital Militaire Reine Astrid, Bruxelles (laboratoire associé: ITG, Anvers).

• Pathogènes impliqués

- *Ehrlichia ewingii*.

• Traitement anti-infectieux empirique

- Aucun (traitement documenté).

• Traitement anti-infectieux documenté

- Régime et posologie standard: doxycycline (200 mg po q24h ou 100 mg po q12h).
- Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté): 7 à 14 jours.