



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

3. Indicateurs relatifs aux mesures de privation de liberté en psychiatrie

Numéro d'identification CFQAI 3j-PSY	Numéro de version 0.1	16/01/2013	Page1 de 6
---	--------------------------	------------	------------

3.j Pourcentage des patients dans la population qui sont contentionnés

Description de l'indicateur

**Incidence cumulative pour les patients contentionnés
dans les services résidentiels**

Modifications par rapport à la version précédente

Pas d'application

Table des matières

1	Objectif poursuivi par le Conseil	2
2	Motivation du choix de l'indicateur	2
3	Description de l'indicateur	2
4	Numérateur et dénominateur	3
5	Domaine	4
6	Communication/Rapportage	5
7	Interprétation des résultats	5
8	Références	5
9	Annexes	5



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

3. Indicateurs relatifs aux mesures de privation de liberté en psychiatrie

Numéro d'identification CFQAI 3j-PSY	Numéro de version 0.1	16/01/2013	Page2 de 6
---	--------------------------	------------	------------

3.j Pourcentage des patients dans la population qui sont contentonnés

1 Objectif poursuivi par le Conseil

Dans un avenir proche, il s'agira de comparer les services hospitaliers psychiatriques en ce qui concerne l'application des mesures de contrainte.

Cette comparaison permettra aux autorités de se faire une idée de l'application des mesures de contrainte et d'en suivre la tendance, après la mise en œuvre d'une directive pratique.

2 Motivation du choix de l'indicateur

La littérature cite notamment la nécessité d'une collecte systématique de données en fonction de la communication aux personnes concernées et la mise en place d'un cycle d'amélioration continue en tant que stratégies de prévention concernant l'application des mesures de contrainte.

Il est régulièrement fait référence aux indicateurs suivants :

- nombre d'isolements et de contentions
- durée de l'isolement / de la contention
- nombre de patients isolés et contentonnés

Par ailleurs, la circulaire de Weckx (1990) impose, pour chaque mesure d'isolement, un enregistrement, notamment de la date et de l'heure de début et de suspension de la mesure.

3 Description de l'indicateur

Type d'indicateur	Indicateur de résultat
Description	<p>Le terme "contention" est compris comme : l'ensemble des mesures concernant l'utilisation et l'application de moyens de contention et de protection, par lesquels l'entièreté ou une partie du corps est immobilisé (Manuel d'encodage RPM, MT 13.05). La mesure de contention a pour objectif de mettre un patient, dont le comportement est considéré comme dangereux ou mal adapté à la situation, en sécurité.</p> <p>NB. Nous ne tenons pas compte des contentions pour raisons orthopédiques ou fonctionnelles.</p>



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

3. Indicateurs relatifs aux mesures de privation de liberté en psychiatrie

Numéro d'identification CFQAI 3j-PSY	Numéro de version 0.1	16/01/2013	Page3 de 6
---	--------------------------	------------	------------

3.j Pourcentage des patients dans la population qui sont contentionnés

L'incidence cumulative pour les patients contentionnés exprime la proportion de patients de l'institution contentionnés au moins une fois au cours de la période de référence.

La période de référence est la période sur laquelle portent les données du numérateur et du dénominateur. Cette période est fixée par convention. Il s'agit de l'année civile précédente.

Remarque :

Etant donné qu'il est peu probable que des mesures de contention soient prises pour des patients en hospitalisation partielle, il est préférable de ne tenir compte que des patients dans le cadre d'une hospitalisation résidentielle. Il s'agit des services A, T et K (hormis les services pédopsychiatriques For-K). A cet égard, il est utile de faire une distinction entre d'une part, les services A et T et, d'autre part, le service K. En effet, il existe deux catégories clairement distinctes basées sur l'âge, à savoir « les adultes / personnes âgées » et « les enfants/adolescents ». Ceci est en lien avec l'attention particulière accordée au statut des mineurs dans la législation et les traités nationaux et internationaux. Cette distinction s'avère également utile en raison du fait que les institutions ne disposent pas toutes d'un service K.

4 Numérateur et dénominateur

Indicateur

Incidence cumulative pour les patients contentionnés dans les services



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

3. Indicateurs relatifs aux mesures de privation de liberté en psychiatrie

Numéro d'identification CFQAI 3j-PSY	Numéro de version 0.1	16/01/2013	Page4 de 6
---	--------------------------	------------	------------

3.j Pourcentage des patients dans la population qui sont contentionnés

résidentiels A et T

Numérateur	Nombre total de patients (dans les services A ou T) qui ont été contentionnés au moins une fois au cours de la période de référence x 100
Dénominateur	Nombre total de patients avec au moins une journée d'hospitalisation (dans les services A ou T) au cours de la période de référence
	% des patients hospitalisés (dans les services A ou T) qui ont été contentionnés au moins une fois au cours de la période de référence

Indicateur

Incidence cumulative pour les patients contentionnés dans le service résidentiel K

Numérateur	Nombre total de patients (dans le service K) qui ont été contentionnés au moins une fois au cours de la période de référence x 100
Dénominateur	Nombre total de patients avec au moins une journée d'hospitalisation (dans le service K) au cours de la période de référence
	% des patients hospitalisés (dans le service K) qui ont été contentionnés au moins une fois au cours de la période de référence

5 Domaine

- ☒ Qualité des soins ☒ Sécurité du patient ☐ Satisfaction Patient
☐ Satisfaction Personnel



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

3. Indicateurs relatifs aux mesures de privation de liberté en psychiatrie

Numéro d'identification CFQAI 3j-PSY	Numéro de version 0.1	16/01/2013	Page 5 de 6
---	--------------------------	------------	-------------

3.j Pourcentage des patients dans la population qui sont contentionnés

6 Communication/Rapportage

Responsable	Directeur Département Infirmier
Mode de communication	Fichier Excel CFQAI
Objectif du rapportage	Benchmark national anonymisé
Périodicité	annuelle
Date de démarrage	2012

7 Interprétation des résultats

Quel est le pourcentage de la population de patients résidentiels qui sont contentionnés annuellement.

Cet indicateur ne tient pas compte du nombre de fois qu'un patient individuel est contentionné. Cela présente l'avantage de limiter l'obtention d'une image faussée causée par des outliers éventuels (patients fréquemment contentionnés).

L'indicateur permet la comparaison avec d'autres établissements de soins. En indiquant le nombre de patients de la population au dénominateur, quelques caractéristiques importantes susceptibles d'avoir un impact sur le numérateur et d'entraîner des divergences entre les établissements de soins s'estompent, à savoir 1. la durée de séjour (moyenne), 2. la taille de l'institution et 3. le taux d'occupation réalisé durant la période de référence.

Il est également possible de réaliser une comparaison interne dans une perspective temporelle.

8 Références

Delaney, K.R. (2006). Evidence Base for Practice : Reduction of restraint and seclusion use during child and adolescent psychiatric inpatient treatment. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 3(1), 19-30

Délégué général aux droits de l'enfant, Fédération Wallonie-Bruxelles (2012). Rapport relatif aux mises en isolement des enfants.

www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/dgde_editor/documents/groupes_de_travail/isolement/rapport_relatif_aux_mises_en_isolement_des_enfants.pdf.

Haimowitz, S., Urff, J. & Huckshorn, K.A. (2006). Restraint and Seclusion: A Risk Management Guide. www.nasmhpd.org.



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

3. Indicateurs relatifs aux mesures de privation de liberté en psychiatrie

Numéro d'identification CFQAI 3j-PSY	Numéro de version 0.1	16/01/2013	Page 6 de 6
---	--------------------------	------------	-------------

3.j Pourcentage des patients dans la population qui sont contentionnés

Huckshorn, K. (2004). Reducing seclusion restraint in mental health use settings: core strategies for prevention. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 42 (9), 22-33

Kinderrechtencommissariaat, Vlaams Parlement (2006). Dossier: Checklist kinderen in afzondering.

www.kinderrechten.be/IUSR/documents/volwassenen/dossier_afzondering/KRC06_Afzondering_screen.pdf.

Livingstone, A. (2007). Creating safety: Addressing seclusion practices. Victorian quality council & Chief psychiatrist's quality assurance committee.

Mental Health Commission (2012). The use of seclusion, mechanical means of bodily restraint and physical restraint in approved centres: activities report 2010.

Omzendbrief van de h. H. Weckx, Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en Brusselse aangelegenheden, dd 24/10/90.

Scanlan, J.N. (2011). Interventions to reduce the use of seclusion and restraint in inpatient psychiatric settings: What we know so far, a review of the literature. International Journal of Social Psychiatry, 56(4), 412-423

Smith, G.M., Davis, R.H., Bixler, E.O., Lin, H., Altenor, A., Altenor, R.J., Hardentstine, B.D. & Kopchick, G.A. (2005). Pennsylvania State Hospital System's seclusion and restraint reduction program, Psychiatric Services, 56 (9), 1115 – 1122

Van der Merwe, M., Bowers, L., Jones, J., Muir-Cochrane, E. & Tziggili, M. (2009). Seclusion: a literature review. Report from the conflict and containment reduction research programme. Department of mental health and learning disability, City University London.

Wagner, L. (2001). JCAHO Restraint and seclusion standards.

9 Annexes

/