



**Indicateurs de détection et de prise en charge multidisciplinaire de la
dénutrition**

Numéro d'identification CFQAI 2c	Version Numéro 0.9	10/02/2015	Page 1 de 6
-------------------------------------	-----------------------	------------	----------------

**2 c. Organisation de formations continues pour la détection et la prise en
charge multidisciplinaire de la dénutrition**

Description de l'indicateur

**2c .Organisation de formations continues pour la détection
et la prise en charge multidisciplinaire de la dénutrition**

Modifications par rapport à la version précédente

Pas d'application.

Contenu

1	Objectif poursuivi par le conseil	2
2	Motivation du choix de l'indicateur	2
3	Description de l'indicateur	3
4	Numérateur et Dénominateur.....	4
5	Domaine.....	4
6	Communication/Rapportage	5
7	Interprétation des résultats	5
8	Références.....	5
9	Annexes.....	6



Indicateurs de détection et de prise en charge multidisciplinaire de la dénutrition

Numéro d'identification CFQAI 2c	Version Numéro 0.9	10/02/2015	Page 2 de 6
-------------------------------------	-----------------------	------------	----------------

2 c. Organisation de formations continues pour la détection et la prise en charge multidisciplinaire de la dénutrition

1 Objectif poursuivi par le conseil

Diminuer la prévalence de la dénutrition causée entre autre par un défaut de dépistage et de prise en charge précoce de la dénutrition.

En 2014, tous les hôpitaux belges pourront se comparer sur ce thème, la Belgique pourra se comparer à l'étranger, les autorités connaîtront la situation.

Les chiffres obtenus lors d'une enquête nationale en 2008 - 2009 doivent être affinés et pouvoir être généralisés à l'ensemble du pays.

L'objectif étant qu'à terme un maximum (100%) des hôpitaux belges mettent ce type de formations à disposition de leur personnel.

2 Motivation du choix de l'indicateur

Selon l'étude de prévalence menée par Bocquaert et al. (2009) dans 34 hôpitaux belges (97 unités de soins, 12717 patients et 1258 soignants), la formation du personnel est un élément clef dans la prise en charge de la nutrition. Trop peu de soignants semblent interpellés par la problématique de la dénutrition qui est pourtant un problème de santé publique majeur.

Des besoins de connaissances et de compétences ont été identifiés parmi le personnel hospitalier. Dès lors il y a lieu de revoir l'importance à donner à la formation nutritionnelle non seulement dans les formations de base de chaque intervenant (médecins, infirmiers, aides-soignants, diététiciennes, agents de cuisine) mais il faut mettre en place des formations continuées car l'utilisation d'outils valides et fiables est indispensable dans la pratique quotidienne.

Les recommandations sont de mettre à disposition des ressources humaines, financières et des formations afin d'insister sur l'importance de la formation dans le domaine de la nutrition des intervenants car les connaissances liées cette problématique sont insuffisantes voire absentes.

Tous les professionnels de santé impliqués directement dans les soins aux patients doivent bénéficier de formations, conformément à leur rôle, leur expliquant l'importance de bénéficier d'une nutrition adéquate.



Indicateurs de détection et de prise en charge multidisciplinaire de la dénutrition

Numéro d'identification CFQAI 2c	Version Numéro 0.9	10/02/2015	Page 3 de 6
-------------------------------------	-----------------------	------------	----------------

2 c. Organisation de formations continues pour la détection et la prise en charge multidisciplinaire de la dénutrition

Cette formation devra aborder les points suivants :

1. La dénutrition: la prévalence, la détection et l'approche
2. Le soutien oral nutritionnel et les suppléments
3. La nutrition entérale: les contre-indications, les complications, les modes d'administration et les produits diététiques utilisées
4. La nutrition parentérale: les contre-indications, les complications, les modes d'administration et produits diététiques utilisées
5. Les aspects éthiques et juridiques de la dénutrition

Les professionnels de la santé doivent s'assurer qu' une alimentation et une hydratation adéquate sont dispensées dans un environnement agréable et que les patients bénéficient d'un soutien adéquat (aide pour manger) lors des repas

Cette formation doit être disponible pour l'ensemble du personnel concerné par la nutrition dans l'hôpital (médecins, infirmiers, aides-soignants, diététiciens, agents de cuisine) et doit être communiqué à tous les services.

3 Description de l'indicateur

Type d'indicateur	Indicateur de structure
Description	<ol style="list-style-type: none">1. <u>L'élaboration</u> de formations ayant pour thème le dépistage, l'évaluation et le traitement de la dénutrition afin de mettre en place une politique de prévention Evidence base.2. La <u>présence</u> d'une telle formation est aussi une nécessité.3. Dans ces formations doivent figurer les techniques et moyens de prévention Evidence Based, les bonnes pratiques pour la prévention de la dénutrition ainsi que les noms des personnes responsables ou de contact de ces formations pour la mise à jour du contenu des



**Indicateurs de détection et de prise en charge multidisciplinaire de la
dénutrition**

Numéro d'identification CFQAI 2c	Version Numéro 0.9	10/02/2015	Page 4 de 6
-------------------------------------	-----------------------	------------	----------------

**2 c. Organisation de formations continues pour la détection et la prise en
charge multidisciplinaire de la dénutrition**

formations.

4 Numérateur et Dénominateur

Indicateur formation continue sur la dénutrition (CFQAI 2c)

$$\text{CFQAI 2c} = \frac{2c1 + 2c2}{2}$$

2

Numérateur 1	En 2013, y a-t-il eu au sein de votre institution au minimum une formation organisée ayant pour thème la dénutrition, son dépistage, son évaluation et son traitement?
Dénominateur	/
Réponse 2c1	Oui =1 Non =0

Numérateur 2	Les formations organisées au sein de votre institution ont-elles abordées TOUS les thèmes proposés dans la motivation du choix de l'indicateur (cf. Points 1 à 5) ?
Dénominateur	/
Réponse 2c2	Oui =1 Non =0

5 Domaine

Qualité des soins Sécurité du Patient Satisfaction du patient



**Indicateurs de détection et de prise en charge multidisciplinaire de la
dénutrition**

Numéro d'identification CFQAI 2c	Version Numéro 0.9	10/02/2015	Page 5 de 6
-------------------------------------	-----------------------	------------	----------------

**2 c. Organisation de formations continues pour la détection et la prise en
charge multidisciplinaire de la dénutrition**

Satisfaction du personnel

6 Communication/Rapportage

Responsable	Directeur Département Infirmier
Mode de communication	Electronique via fichier Excel
Objectif du rapportage	Benchmark
Périodicité	annuelle
Date de démarrage	2013

7 Interprétation des résultats

Pour quelle(s) raison(s) votre résultat pourrait-il ne pas être "aussi bon" que dans d'autres institutions ?

Les raisons qui expliquent l'absence d'un tel protocole pourraient-être :

- L'absence de ressources humaines/moyens pour rédiger, diffuser, donner des formations
- Un manque de soutien institutionnel au développement d'un projet de formation continue
- Le manque de motivation de l'un ou l'autre membre à participer à une telle équipe
- L'absence de ressources humaines en qualité ou quantité, et/ou de moyens pour pouvoir développer les connaissances et faire fonctionner une équipe nutritionnelle.

8 Références

Bocquaert, I., Dardenne, O., Lopez Hartmann, M., Jacquemin, P., Vanderwee, K., Geurden, B., Gobert, M., & Defloor, T. (2009). Accompagnement Equipes Nutritionnelles. Bruxelles: Service Public Fédéral, Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. (150p)



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit
Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

Indicateurs de détection et de prise en charge multidisciplinaire de la dénutrition

Numéro d'identification CFQAI 2c	Version Numéro 0.9	10/02/2015	Page 6 de 6
-------------------------------------	-----------------------	------------	----------------

2 c. Organisation de formations continues pour la détection et la prise en charge multidisciplinaire de la dénutrition

Daem, M., Courtens, A., Van Durme, T., Bocquaert, I., Gobert, M., Defloor, T. (2008). L'implémentation des recommandations evidence – based en vue de l'optimisation de la prise en charge nutritionnelle des patients en gériatrie: une recherche-action. Bruxelles, Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Guidelines European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (Espen, 2006).

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (2010). Universiteit Maastricht ; Caphri School for Public Health and Primary Care, Departement of health Care and Nursing Science.

Plan National Nutrition Santé. Groupe d'experts scientifiques: recommandations pour le dépistage et l'évaluation de la dénutrition.

National Collaborating Centre for Acute Care, February 2006. Nutrition support in adults Oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition.

National Collaborating Centre for Acute Care, London. Available from www.rcseng.ac.uk

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES Nutritional support strategy for protein-energy malnutrition in the elderly (GUIDELINES HAS Haute Autorité de Santé). April 2007.

<http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/Nursingpractitioners/EvidenceBasedNursing/index.htm>

9 Annexes

Néant