

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		1 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

<u>Description de l'indicateur</u>
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique

Modifications par rapport à la version précédente

Pas d'application.

Contenu

1	Objectifs poursuivis par le conseil	2
2	Motivation du choix de l'indicateur	4
3	Description de l'indicateur	7
4	Numérateurs et dénominateur	8
5	Domaine	8
6	Communication/Rapport	9
7	Interprétation des résultats	9
8	Références	9
9	Annexes	11

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		2 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

1 Objectifs poursuivis par le conseil

La série d'indicateurs du CFQAI concernant le thème de soins ***contention physique des patients dans les hôpitaux aigus*** est basée sur les conclusions du rapport final de la commission technique de l'art infirmier sur la contention et l'isolement (SPF Santé publique, octobre 2007) :

1. La prestation technique de soins infirmiers B1 : « Mesures de prévention de lésions corporelles : moyens de contention, procédure d'isolement, prévention de chutes, surveillance » demeure une ***mesure d'exception***, prise de préférence après ***concertation pluridisciplinaire***, en accord avec ***le patient ou son représentant ou parent***. Dans la procédure, qui est obligatoirement rédigée, il est stipulé que le praticien infirmier peut, si nécessaire, de manière autonome, appliquer une mesure privative de liberté, laquelle doit néanmoins faire le plus rapidement possible l'objet d'une concertation d'équipe multidisciplinaire. Ainsi, le praticien infirmier conserve la possibilité d'appliquer, en cas d'urgence et sans délai, une mesure de privation de liberté selon les dispositions de la procédure. Il est recommandé de prévoir une structure en forme d'arbre décisionnel dans la procédure reprenant les mesures prévues (algorithme).
2. L'application de mesures privatives de liberté implique automatiquement que l'infirmier ***renforce la surveillance*** du patient afin de garantir sa sécurité.
3. Dans la concertation visant à prévenir, limiter ou accepter le risque de lésion corporelle, le choix se porte toujours sur la ***mesure privative de liberté la moins radicale***.
4. Les ***causes sous-jacentes*** du problème mental sont toujours recherchées et traitées si nécessaire.
5. Les praticiens infirmiers et les établissements et organisations où ils travaillent visent à mener une ***politique de contention et d'isolement minimale***. Pour mettre en œuvre cette politique, le pouvoir organisateur de l'établissement ou de l'organisation

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		3 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

doit adopter les mesures suivantes :

- Élaborer une **procédure, après concertation multidisciplinaire**, pour l'établissement, éventuellement spécifique à chaque service.
- Disposer d'un **personnel infirmier en nombre suffisant**, dont au moins deux personnes la nuit pour une unité de soins de 30 lits (dont au moins 1 infirmier/ère).
- **Aménager les chambres de manière pratique et prévoir un équipement efficace**, le tout correctement entretenu.
- Prévoir une formation efficace des prestataires de soins concernés, à intervalles réguliers.

Les normes actuelles ne permettent pas de prévoir deux membres du personnel la nuit pour une unité de soins de 30 lits. Les autorités devront d'urgence adapter les normes de personnel pour pouvoir atteindre cet objectif.

6. Les principes politiques et l'application de mesures privatives de liberté sont consignés dans une procédure. Il est tenu compte ici des **lois** suivantes :

- La Convention européenne des droits de l'homme (art. 5) ;
- La Constitution belge (art. 12) ;
- La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (art. 5).
- La loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
- La loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental;
- La circulaire ministérielle de la Communauté flamande du 24 octobre 1990 relative à l'isolement des patients admis en hôpital psychiatrique et dans les services de psychiatrie des hôpitaux généraux;

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		4 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

- L'article 422*bis* du Code pénal.

7. La procédure décrit les **accords** conclus pour une contention et un isolement corrects du patient : préparation (quels matériels utiliser...) et mise en œuvre (ordre des actes, points d'attention, précision sur le plan technique...), mesures de sécurité – entre autre l'indication et la façon d'augmenter la surveillance, suivi et entretien correct du matériel.
8. Les mesures prises sont décrites en détail et justifiées dans le **dossier du patient** et évaluées quotidiennement par l'équipe.
9. Pour obtenir sa collaboration, on explique en premier lieu **au patient** la ou les raisons à l'origine d'une mesure prise.

On utilise la définition suivante de la contention physique : il s'agit de la contention physique au sens large appliquée à des personnes adultes (18 ans et plus) et qui concerne " **tout acte ou toute utilisation de matériel qui limite la liberté de mouvement et ne peut pas être enlevé facilement** " (Milisen et coll., 2006).

2 Motivation du choix de l'indicateur

Une étude de Kristine Slachmuylders (2013) a examiné la prévalence, les raisons et les facteurs de risque en rapport avec la contention physique de patients flamands hospitalisés. Par ailleurs, l'auteur a interrogé des prestataires de soins sur leur connaissance, attitude et processus décisionnel en rapport avec la contention. L'étude s'est déroulée dans 4 hôpitaux anversois avec 1584 patients. En outre, 198 praticiens infirmiers et soignants ont été interrogés sur leurs connaissances, attitude et mode de décision.

La prévalence de la contention physique était de 48 %. Sans barrières de lit, elle était encore de 16 %. La raison principale était la prévention des chutes. Un âge plus élevé et une plus grande dépendance étaient associés à un risque accru de contention. Des lacunes sont apparues dans la 'connaissance de la contention' en matière de sécurité du patient et de

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		5 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

législation, tandis que l'attitude par rapport à la contention était modérément positive. Les prestataires de soins se concertent surtout avec des collègues. Cette étude met en évidence une prévalence élevée de la contention et des lacunes importantes dans la connaissance et le comportement. Afin de garantir la sécurité des patients au sein des hôpitaux flamands, il est nécessaire de mettre en place une politique de contention reposant sur quatre piliers : (1) une organisation axée sur le recours minimum à la contention, (2) une bonne politique de l'éducation, (3) la connaissance des solutions alternatives et (4) une directive scientifiquement fondée. L'étude a conclu que la recherche de stratégies éducationnelles efficaces, l'utilisation de solutions alternatives dans les soins aigus et l'instauration d'une politique de la contention avalisée sont indiquées.

Dans un récent rapport d'étude de l'Inspection néerlandaise de la santé , en décembre 2012, « **Des efforts supplémentaires nécessaires pour réduire la limitation de liberté dans les soins de longue durée : accroître l'intervention d'experts externes et mieux cibler la réduction** », la décision de procéder à la limitation de liberté était imprécise dans 43 % et plus ou moins précise dans 35 %. La mise en œuvre n'affichait pas non plus un bon score : imprécise dans 26 % et plus ou moins précise dans 56 %. La raison des mauvais scores tient au fait qu'un certain nombre de critères de qualité ne sont pas satisfaits, tels que l'intervention d'experts externes, la réduction ciblée de la limitation de liberté et de bons rapports. Toutefois, l'étude met également en évidence qu'il est tout à fait possible de réduire les limitations de liberté. Les limitations de liberté évaluées par l'Inspection avaient été réduites de manière précise dans trois quarts des cas. Dans un peu moins d'un quart des cas, la réduction avait été réalisée de manière plus ou moins précise et imprécise dans 5 %. Dans 88 % des cas, le client ou son représentant ont estimé que la solution alternative était meilleure que réduire la limitation de liberté. Les prestataires de soins ont pu indiquer de nombreux facteurs de succès pour une réduction réussie et justifiée de l'utilisation de sangles ou de l'isolement. La participation du client et de son représentant, une approche multidisciplinaire et une bonne analyse du comportement (problématique) du client ont

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		6 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

souvent été citées.

Dans une étude allemande portant sur 4 hôpitaux aigus et 61 unités de soins, la prévalence de la contention physique observée chez 1267 patients était passée de 6,2 % à 16,6 %. Les caractéristiques qui influencent une contention physique étaient l'âge (> 80 ans ; odds ratio ou OR :4,34, 95 % CI : 2,18-8,64), une sonde gastrique (OR :2,70, 1,40-5,22), une sonde vésicale (6,52, 3,75-11,34 et l'admission aux soins intensifs (3,39, 1,28-8,29). L'admission en chambre commune (0,55, 0,35-0,89) et un cathéter veineux central étaient inversement liés à la contention physique (Krüger et al 2013). Une étude d'intervention sur 24 mois a introduit une politique et un programme de contention minimum (incluant l'éducation, la consultation et l'offre de solutions alternatives) dans 13 centres d'hébergement et de soins avec 6 centres dans le groupe d'intervention et 7 centres dans le groupe de contrôle. L'intervention a montré une baisse de l'utilisation de la ceinture de contention dans le groupe d'intervention (3 %) par rapport au groupe de contrôle (13 %) pour une population d'étude de plus de 900 résidents (Gulpers et coll. 2013). Un cluster d'essai contrôlé randomisé de 40 unités de soins dans des centres d'hébergement et de soins a montré un effet positif de la mise en place d'une politique de contention minimale sur la connaissance, l'attitude et le recours à la contention physique (Pellfolk et coll. 2010). Une étude d'intervention sur 4 mois dans 4 hôpitaux aigus a également mis en lumière l'incidence d'une politique et d'un programme de contention minimum (Enns et coll. 2014). La contention physique de patients âgés de plus de 65 ans a évolué de 16 % à 27 % avant l'intervention et de 7 % à 14 % après l'intervention.

Dans le prolongement des conclusions du rapport final de la commission technique de l'art infirmier sur la contention et l'isolement et des récents résultats des études menées en Flandre, aux Pays-Bas et sur le plan international, le CFQAI propose un indicateur de processus relatif à la surveillance accrue des patients sous contention physique dans l'ensemble des hôpitaux aigus belges.

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		7 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

3 Description de l'indicateur

Type d'indicateur	Indicateur de processus
Description	<p>L'exécution de la surveillance accrue du patient – comme décrite dans le protocole, est notée dans le dossier infirmier avec pour objectif de porter une attention accrue aux besoins de base et à la sécurité du patient sous contention.</p> <p>Les données sont récoltées un jour par trimestre.</p>

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		8 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

4 Numérateurs et dénominateur

$\text{CFQAI 5e} = \frac{P_t * 100}{P_{tot}}$	
	Les données sont rassemblées durant 24 h - 1 jour par trimestre.
Numérateur	P_t = nombre de patients sous contention physique et surveillance accrue comme décrit dans le protocole
Dénominateur	P_c : nombre de patients sous contention physique
Résultat	<p>CFQAI 5e₁ – jour 1 =..... %</p> <p>CFQAI 5e₂ – jour 2 =..... %</p> <p>CFQAI 5e₃ – jour 3 =..... %</p> <p>CFQAI 5e₄ – jour 4 =..... %</p>

5 Domaine

- ☒ Qualité des soins
 ☒ Sécurité du patient
 ☐ Satisfaction du patient
☐ Satisfaction du personnel

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		9 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

6 Communication/Rapport

Responsable	Directeur Département Infirmier
Mode de communication	Mail
Objectif du rapport	Benchmark
Périodicité	Annuelle
Date de démarrage	2015

7 Interprétation des résultats

Raisons pouvant motiver de moins bons résultats.

Les raisons qui expliquent l'absence de surveillance accrue pourraient être les suivantes :

- Protocole insuffisamment connu, faute de recyclage et de suivi;
- Manque de motivation pour appliquer le protocole.

8 Références

Rapport final de la commission technique de l'art infirmier, groupe de travail contention et isolement.

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, octobre 2007.

Fysieke fixatie in Antwerpse ziekenhuizen een prevalentie meting met peiling naar kennis, houding en beslissingsbevoegdheid en het ontwerp van een educatiepakket (La contention physique dans des hôpitaux anversois, une mesure de la prévalence avec questionnaire sur la connaissance, l'attitude et le pouvoir de décision et projet de dossier pédagogique).

Rapport final projet PWO sur la contention, chercheuse principale Kristin Slachmuylders.

Karel De Grote – Hogeschool, vzw departement gezondheidszorg, mars 2013.

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		10 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige zorg: meer engagement externe deskundigen en betere focus op afbouw (Des efforts supplémentaires nécessaires pour réduire la limitation de liberté dans les soins de longue durée : accroître l'intervention d'experts externes et mieux cibler la réduction).

Inspection de la santé publique, ministère néerlandais de la Santé, du Bien-être et des Sports, Utrecht, décembre 2012.

Milisen K, Vandenberghe J, Sabbe M, Lagau R, Braes T, Vanderlinden V, Kerckhofs K, Buyschaert K, Verbruggen F, Vaneeckhout S, Vanberghe K, Meyfrod G, Dewolf J, Vandenberghe R, Vandesande J, Verbist A, Vandeweege H, Nicaise L, Van Nuffelen R, Deboutte P, Lekeu R, Waer M, Rademakers F et Joosten E pour l'UZ Leuven, groupe de travail delirium. Directives relatives aux mesures privatives de liberté pour la sécurité du patient à l'UZ Leuven. Tijdschrift voor Geneeskunde 62 (23) 2006.

Enns E, Rhemtulla A, Ewa V, Fruetel K, Holroyd-Leduc JM 2014. A controlled quality improvement trial to reduce the use of physical restraints in older hospitalized adults. Journal of American Geriatric Society 62(3):541-5.

Gulpers M, Bleijlevens MH, Ambergen T, Capezuti E, van Rossem E, Hamers JP 2013 Reduction of Belt Restraint Use: Long-Term Effects of the EXBELT Intervention. Journal of American Geriatric Society 61:107–112.

Krüger C, Mayer H, Haastert B, Meyer G 2013 Use of physical restraints in acute hospitals in Germany: A multi-centre cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies 50 (2013) 1599–1606.

FRKVA/ CFQAI			
Indicateurs de contention physique dans les hôpitaux aigus			
Numéro d'identification	Version numéro	17/08/2015	Page
CFQAI-FRKVA 5e	0.1		11 de 12
5e. Surveillance accrue des patients sous contention physique			

Milisen K, Vandenberghe J, Sabbe M, Lagau R, Braes T, Vanderlinden V, Kerckhofs K, Buyschaert K, Verbruggen F, Vaneeckhout S, Vanberghe K, Meyfrod G, Dewolf J, Vandenberghe R, Vandesande J, Verbist A, Vandeweege H, Nicaise L, Van Nuffelen R, Deboutte P, Lekeu R, Waer M, Rademakers F et Joosten E pour l'UZ Leuven, groupe de travail delirium. Directives relatives aux mesures privatives de liberté pour la sécurité du patient à l'UZ Leuven. Tijdschrift voor Geneeskunde 62 (23) 2006.

Pellfolk TJ, Gustafson Y, Bucht G, Karlsson S. Effects of a Restraint Minimization Program on Staff Knowledge, Attitudes, and Practice: A Cluster Randomized Trial Journal of the American Geriatrics Society 2010 Jan;58(1):62-9.

9 Annexes

Néant

