

RICKETTSIOSE: REMARQUES PREALABLES

• Pathogènes humains

- *Orientia tsutsugamushi*.
- *Rickettsia aeschlimanii*.
- *Rickettsia africae*.
- *Rickettsia australis*.
- *Rickettsia conorii*.
- *Rickettsia felis*.
- *Rickettsia heilongjiangensis*.
- *Rickettsia helvetica*.
- *Rickettsia honei*.
- *Rickettsia japonica*.
- *Rickettsia parkeri*.
- *Rickettsia prowazekii*.
- *Rickettsia raoultii*.
- *Rickettsia rickettsii*.
- *Rickettsia sibirica*.
- *Rickettsia slovaca*.
- *Rickettsia typhi*.
-

• Zoonose

- Réservoirs.
 - Chats (*Rickettsia felis*).
 - Ecureuils volants (*Rickettsia prowazekii*).
 - Etres humains (*Rickettsia prowazekii*).
 - Mites (*Orientia tsutsugamushi*),
 - Rats (*Rickettsia typhi*).
 - Autres rongeurs (*Rickettsia rickettsii*, *Rickettsia conorii*, *Rickettsia africae*, *Rickettsia parkeri*, *Rickettsia sibirica*, *Rickettsia honei*, *Rickettsia japonica*, *Rickettsia helvetica*).
 - Souris (*Rickettsia typhi*).
 -
- Transmission.
 - Tiques (*Rickettsia rickettsii*, *Rickettsia conorii*, *Rickettsia japonica*, *Rickettsia sibirica*, *Rickettsia australis*, *Rickettsia slovaca*, *Rickettsia africae*, *Rickettsia honei*, *Rickettsia aeschlimanii*, *Rickettsia helvetica*, *Rickettsia parkeri*, *Rickettsia heilongjiangensis*, *Rickettsia raoultii*, ...).
 - Poux du corps humain (*Rickettsia prowazekii*).
 - Mouches (*Rickettsia typhi*).
 - Larves de mites (*Orientia tsutsugamushi*).