

“STAPHYLOCOCCAL SCALDED SKIN” SYNDROOM (SSSS)

• **Klinische aspecten en commentaren**

- Eveneens gekend als de ziekte van Ritter (pemphigus neonatorum).
- Veralgemeende intra-epidermale loslating van de huid veroorzaakt door het exfoliatief toxine geproduceerd door *Staphylococcus aureus* (bulleuze impetigo is de lokale variant). Zacht wrijven over de ogenschijnlijk normale huid veroorzaakt vorming van rimpels en loslating van de huid (teken van Nikolsky).
- Differentiaaldiagnose met toxische epidermale necrolyse of TEN (gekenmerkt door loslating van de huid op de junctie tussen dermis en epidermis) gebeurt op basis van biopsie. TEN wordt veroorzaakt door een overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen (sulfamiden, barbituraten, pyrazolone derivaten, ...). TEN is een ernstigere pathologie dan SSSS.

• **Betrokken pathogenen**

- *Staphylococcus aureus* (met productie van exfoliatief toxine).

• **Empirische anti-infectieuze behandeling**

- Regimes en standaard posologieën.
 - Flucloxacilline (2 g iv q4h).
 - Oxacilline (2 g iv q4h).
- Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling: 10 tot 14 dagen.