

SYPHILIS: INFECTION TERTIAIRE, INFECTION LATENTE TARDIVE, INFECTION LATENTE DE DUREE INCONNUE

• *Aspects cliniques et commentaires*

- Symptomatologie.
 - Syphilis latente tardive: pas de manifestations cliniques, contractée \geq 1 an avant l'évaluation actuelle.
 - Syphilis latente de durée inconnue: pas de manifestations cliniques.
 - Syphilis tertiaire: gommés, syphilis cardiovasculaire (aortite, ...),
- Maladie à déclaration obligatoire en Région Flamande et Région Bruxelles Capitale.
- Centre national de référence belge: ITG, Anvers.

• *Pathogènes impliqués*

- *Treponema pallidum*.

• *Traitement anti-infectieux empirique*

- Aucun (traitement documenté).

• *Traitement anti-infectieux documenté*

- Régime: benzathine pénicilline G.
- Posologie standard (benzathine pénicilline G): 3 doses de 2,4 millions d'unités internationales/dose administrées im avec des intervalles de 1 semaine [remplacement d'une partie du solvant (0,5 à 1 cc) par une solution de lidocaïne 1% sans épinéphrine peut diminuer la douleur à l'injection].
- Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté): 2 semaines (3 doses).